



CORIANDRUM SATIVUM L.

CORIANDRE 'Corilia 2'

Fournisseur : Iteipmai

Obtenteur : -

Semences

Lot : 17C_01

Mise à jour de la fiche : 2023

DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE

Extraction de Weenat (26)



PRECOCITE DE FLORAISON



DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Année(s) d'expérimentation : 2023



Débouché ciblé : production d'huile essentielle

Localisation géographique de la parcelle : Montboucher-sur-Jabron (26740)

Type de sol : limoneux sableux



Date de semis : 11 Janvier 2023

Densité de semis : 6,11 kg/ha

Matériel utilisé pour le semis : semoir planteur 2 Kuhn monosem (75cm inter-rang)



Itinéraire cultural : Binage Einböck le 3 mai 2023, Fertilisation (50 unités de 12.10.18 et 28 unités de so3) le 9 mai 2023, binage le 7 avril 2023.

Date de récolte : 7 Juillet 2023 (S+177)

SEMENCE



Diamètre de la semence

Moyen : 2,94 mm

Mini : 2,44 mm

Maxi : 3,37 mm

PHÉNOTYPE

164 GREYED
ORANGE GROUP
Moderate Orange
Yellow B



165 GREYED
ORANGE GROUP
Brownish
Orange B

L'ensemble des variétés suivies a les mêmes nuances de teintes au niveau des graines :

164 GREYED - ORANGE GROUP - Moderate Orange Yellow B
(Royal Horticultural Society)

Dressé	Buisonnant	Globuleux	Etalé	Rampant
Toutes les tiges sont dressées vers le haut	Forme un buisson aplati sur le dessus	Forme une boule	Port ouvert au centre avec de tiges retombantes sur le côté	Tiges très peu érigées, retombantes ou rasant le sol

CINÉTIQUE DE CROISSANCE




RENDEMENT

	BFFO	teneur en HE (mlHE/100g de matière sèche)
Récolte	Rendement moyen en graine (kg/ha)	0,71
Moyennes des 6 variétés	240 (+/- 51)	0,83

PHYTOCHIMIE

Unité : µg/g



SANITAIRE

Cette année aucune maladie ou ravageur n'ont été aperçus sur la parcelle.

Intensité des symptômes observés :

